

Communication médicale

le 30 avril 2009

Recherche de critères d'évaluation cliniques sensibles dans la forme progressive primaire de la sclérose en plaques

Résumé

L'étude de la SP progressive primaire exige des instruments de mesure très sensibles de la progression des incapacités. Au total, 161 personnes atteintes de cette forme de SP ont participé à une recherche d'une durée de plus de deux ans, qui prévoyait la prise de mesures à trois intervalles de temps. **Mult Scler**, 21 avril 2009

Détails

Dans la SP progressive primaire, l'évaluation clinique de la progression des incapacités pose des difficultés, par exemple dans les études longitudinales observationnelles ou les essais cliniques. Les mesures cliniques actuelles ne sont pas suffisamment sensibles pour déceler l'aggravation clinique des incapacités. La présente étude a montré que parmi une série de tests éprouvés, la combinaison de deux d'entre eux, soit le test visant à mesurer la vitesse de marche sur environ sept mètres et l'évaluation au moyen de l'échelle EDSS d'usage courant, s'est révélée la méthode de détection la plus sensible de l'aggravation clinique des incapacités et la plus précise (elle ne donne pas de faux résultats d'amélioration). Les auteurs laissent également supposer que plus les périodes de suivi sont longues, plus cette combinaison est efficace.

Recherche et programmes nationaux

Available in English.